

Uso tradicional **recomendado**

Ayuda a aliviar los síntomas causados por las hemorroides como: inflamación, dolor y picazón. Hemopropin® ungüento crea una película protectora para disminuir la irritación de la mucosa anal y defecación dolorosa.

Vía de **administración**

Vía rectal.



Modo de aplicación **de Hemopropin®**

Recomendado solo para uso externo. Exclusivo para adultos.

La higiene personal es fundamental para controlar los síntomas hemorroidales. Por ello, se debe mantener limpia la zona anal, para lo que se recomienda lavarla sobre todo después de cada defecación, se puede utilizar jabón suave y secarla sin frotar con una toalla limpia. Aplicar Hemopropin® en la zona anal limpia y seca, por la mañana, por la noche y después de cada defecación.

En periodos agudos aplicar Hemopropin® en la zona anal limpia y seca, por la mañana y por la noche, y cuando los síntomas disminuyen aplicar sólo en la noche.

Hemopropin® también puede ser usado con un aplicador colocado en el tubo en lugar de la tapa. (Ver figura).



Uso de Hemopropin® **con aplicador**

1. Quite la tapa del tubo.
2. Coloque y ajuste el aplicador en el tubo.
3. Retire la tapa protectora del aplicador.

